

Информация по обезболивающей терапии для больных, страдающих онкологическими заболеваниями

Уважаемые жители

В этой статье мы затронем такую актуальную проблему нашей жизни, как рост заболеваемости онкологическими заболеваниями.

Согласно статистике, на каждого больного, у которого диагностирован рак, приходится около 10 человек из группы повышенного онкологического риска. Кто же имеет этот повышенный риск? Это все люди старше 45 лет, лица подверженные негативному воздействию канцерогенов в бытовых условиях или в рамках выполнения трудовых обязанностей, курильщики; лица, перенесшие облучение радиацией; люди, страдающие заболеваниями в хронической форме. Среди таких людей больные атеросклерозом, гипертонией, сахарным диабетом, ожирением. Так, по данным научно-практических Центров нашей страны и зарубежья, злокачественными опухолями желудка в 15% случаев предшествовали длительно существующие язвы, хронический атрофический гастрит, в 30% случаев рака молочной железы- фиброаденомы, раку шейки матки- в 42% эрозии. То же можно сказать и о раке прямой кишки (полипы, трещины), полости рта, нижней губы (лейкоплакии, хронические язвы), раке кожи (трофические язвы, хронические травмы, келоидные рубцы). К особой группе относятся лица имеющие предраковые заболевания. Суть этих заболеваний- различные степени дисплазий и атипий в клеточном составе. Такие «дремлющие» клетки под воздействием различных причин могут стать активными, и переродиться в раковые. По этой причине мы снова и снова говорим с вами о важности и необходимости регулярных медицинских осмотров, о здоровом образе жизни, об отказе от вредных привычек.

Если вы имеете какой-либо хронический недуг, даже если вы неплохо себя чувствуете, пройдите ряд несложных обследований в нашей поликлинике.

Своевременное обследование позволит выявить опухоль на ранней стадии, что существенно повышает шанс полного излечения от опухоли. Обезопасьте себя от запущенных онкологических заболеваний! Разумное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких может помочь избежать столь серьезного заболевания, как рак. Определить риск онкологических заболеваний вы сможете при прохождении диспансеризации. Обратиться можно напрямую в кабинет №118 поликлиники по адресу: ул. Гагарина д.143б с 8.00 до 19.00. Будьте здоровы!

Что нужно знать пациенту о получении обезболивающих препаратов

Право на обезболивание гарантировано гражданину законом. Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет, что пациент имеет право на «облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами».

Любой пациент с болевым синдромом, вне зависимости от диагноза, имеет право на получение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркосодержащих. Эффективное обезболивание можно и нужно получать не только при нахождении в стационаре или хосписе, но и при лечении на дому. В последнее время в законодательстве произошли важные изменения, существенно упростившие выписку, назначение и получение обезболивающих препаратов.

Главные изменения, которые нужно знать пациенту или его законному представителю:

- рецепт на наркотический лекарственный препарат, купирующий болевой синдром, может быть выдан пациенту любым участковым врачом;
- врач обязан выписать повторный рецепт на обезболивающий лекарственный препарат без возврата ранее выданных и использованных упаковок, ампул, трансдермальных систем;
- срок действия рецепта на получение в аптеке наркотического лекарственного препарата, купирующего болевой синдром, увеличен с 5 до 15 дней;
- рецепт на наркотический обезболивающий препарат может получить как сам пациент, так и его законный представитель (родственник). При получении рецепта родственником в амбулаторной карте пациента и рецепте делается специальная отметка. Чтобы доказать врачу факт родственной связи достаточно иметь паспорт или иные документы это подтверждающие;
- пациентам, нуждающимся в длительном лечении болевого синдрома, доза выдачи наркотических лекарственных препаратов для его купирования может быть увеличена в 2 раза.