

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Рак прямой кишки, как и другие злокачественные заболевания, никогда не развивается в здоровом организме, а возникает у людей, страдающих хроническими заболеваниями прямой кишки.

Своевременное лечение этих заболеваний ведет к уменьшению заболеваемости раком прямой кишки.

Развитию рака могут способствовать длительно незаживающие изъязвления, трещины, хронический геморрой, хронические заболевания желудка и кишечника, вызывающие запоры. Очень часто рак прямой кишки возникает из полипов.

Полипы – доброкачественные опухоли, растущие на стенке кишечника, которые при длительном существовании могут перейти в рак.

Наиболее частыми признаками заболевания прямой кишки являются кровянистые выделения, иногда частые и значительные, возникающие до, во время и после опорожнения кишечника.

В некоторых случаях наблюдаются выделения слизи, реже бывают сукровичные или сукровично-гнойные выделения, пачкающие белье, наблюдается также ощущение затруднения и боли при испражнении, изменении формы кала, ложные позывы.

Особенно важно своевременное выявление и лечение заболеваний прямой кишки.

Не откладывайте посещение к врачу при малейшем отклонении в вашем здоровье. Полипы, доброкачественные опухоли и рак прямой кишки на ранних стадиях развития не проявляются клиническими симптомами, по этой причине **всем мужчинам и женщинам старше 30 лет необходимо ежегодно проходить медицинский осмотр в смотровом кабинете по месту жительства.**

Своевременное лечение заболеваний прямой кишки позволит

Вам сохранить здоровье и жизнь!

Врач смотрового кабинета Гриднева Л.А.