



Герпетический кератит

Герпетический кератит – воспаление роговицы, вызванное вирусом простого герпеса (herpes simplex), который является нейродермотропным вирусом, присутствующим в организме человека с самого детства. Вирус простого герпеса - наиболее частая инфекционная причина слепоты.

Признаком инфицированности вирусом герпеса является высокий титр специфических антител. Большинство малышей рождается с антителами к вирусу простого герпеса по причине наличия их у матерей. В продолжение первого полугодия жизни антитела к герпесу исчезают.

Большинство взрослых людей являются здоровыми носителями вируса. При определённых показателях иммунитета, вирус герпеса не вызывает болезни до момента усиления его вирулентности. Активации вируса обычно способствуют такие факторы, как:

- переохлаждение;
- стрессы;
- ультрафиолетовое облучение;
- нейроэндокринные сдвиги.

Болезнь часто носит характер системного поражения глаз, слизистых оболочек, центральной и периферической нервной системы.



Первичный герпес. Наблюдается часто в первые 2-4 года жизни.

Симптомы первичного герпеса

Большинство случаев проявляется лишь повышением температуры тела, недомоганием и симптоматикой поражения верхних дыхательных

путей. Может развиваться блефароконъюнктивит, чаще протекающий благоприятно и спонтанно разрешающийся. В редких случаях развиваются микродревовидные инфильтраты на роговице.

Осложнения герпетического кератита

- вторичная инфекция – развитие микробного кератита;
- увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза;
- катаракта – помутнение хрусталика;
- вторичная глаукома.

Заболевание может приводить к серьёзным осложнениям. Чтобы не допустить их развития, необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Муравьева Г. С.